

# Fitxa de camp

|             |  |                         |  |                        |  |
|-------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| Voluntari/a |  | Parc/Platja             |  | Data                   |  |
| Hora inici  |  | Vent inici <sup>1</sup> |  | Sol inici <sup>2</sup> |  |
| Hora final  |  | Vent final <sup>1</sup> |  | Sol final <sup>2</sup> |  |

|   | ESPÈCIE                       | PRESÈNCIA PER MES       | RECOMPTE   |   |   |           |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------|---|---|-----------|
|   |                               |                         | TRANSSECTE |   |   | PASSEJADA |
|   |                               |                         | 1          | 2 | 3 |           |
| R | <i>Anthocharis cardamines</i> | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Aricia cramera</i>         | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Brintesia circe</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Cacyreus marshalli</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Callophrys avis</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Callophrys rubi</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Carcharodus alceae</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Celastrina argiolus</i>    | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Charaxes jasius</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Coenonympha dorus</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Coenonympha pamphilus</i>  | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Colias crocea</i>          | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Danaus chrysippus</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Danaus plexippus</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Euchloe crameri</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Euphydryas aurinia</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Favonius quercus</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Gegenes nostrodamus</i>    | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Glaucopsyche melanops</i>  | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Gonepteryx cleopatra</i>   | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Gonepteryx rhamni</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Hipparchia fidia</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Hipparchia semele</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Hipparchia statilinus</i>  | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Iphiclides feisthamei</i>  | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Lampides boeticus</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Lasiommata megera</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Leptotes pirithous</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Libythea celtis</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Lycaena phlaeas</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Maniola jurtina</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Melanargia occitanica</i>  | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| O | <i>Melanargia lachesis</i>    | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Melitaea didyma</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Ochlodes sylvanus</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Papilio machaon</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pararge aegeria</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pieris brassicae</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pieris rapae</i>           | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Polyommatus icarus</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pontia daplidice</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Pyrgus armoricanus</i>     | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Pyrgus malvoides</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pyronia bathseba</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Pyronia cecilia</i>        | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
| R | <i>Pyronia tithonus</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Thymelicus acteon</i>      | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Vanessa atalanta</i>       | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   | <i>Vanessa cardui</i>         | G F M A M J J A S O N D |            |   |   |           |
|   |                               |                         |            |   |   |           |
|   |                               |                         |            |   |   |           |
|   |                               |                         |            |   |   |           |

# Fitxa de camp

Observacions:

R = rarament present a la ciutat, molt improbable d'aparèixer als censos; O = ocasionalment present a la ciutat, improbable d'aparèixer als censos

Recorda que per a censar és convenient que es donin les següents condicions meteorològiques:

- Temperatura de 13 a 35 °C.
- De 13 a 17 °C ha d'haver-hi un mínim de 50 % de sol.
- Amb més 18 °C es poden fer els censos amb menys de 50 % de sol.

**Per a espècies en les quals sigui senzill reconèixer el sexe és convenient anotar-lo per als individus en què ho vegis clarament.**

<sup>1</sup>Velocitat del vent en funció de l'escala de Beaufort. Si hi ha ratxes de vent tria un valor mitjà:

| Velocitat (km/h) | Valor | Efectes   |
|------------------|-------|---|
| 0 - 1            | 0     | El fum ascendeix verticalment.  |
| 2 - 5            | 1     | El fum indica la direcció del vent.   |
| 6 - 11           | 2     | Es mouen les fulles dels arbres. El vent es nota a la cara.                                     |
| 12 - 19          | 3     | Es mouen les branques, onegen les banderes.   |
| 20 - 28          | 4     | S'aixeca pols i papers. Es mouen les capçades dels arbres. És preferible censar amb menys vent. |
| > 29             | 5     | Es mouen els arbres petits i les branques de mides considerables.                               |

<sup>2</sup>Escala de categories del sol (versus nuvolositat):

| Valor | Efectes   |
|-------|---|
| S     | Completament assolellat.  |
| SSN   | Assolellat amb alguns núvols.   |
| SN    | Mig destapat, mig ennuvolat. Censar si la temperatura > 18 °C.              |
| SNN   | Pràcticament tapat, es veu un poc el sol. Censar si la temperatura > 18 °C. |
| N     | Completament tapat. No censar.  |