

Voluntari/a		Espai fluvial		Data	
Hora inici		Vent inici ¹		Sol inici ²	
Hora final		Vent final ¹		Sol final ²	

	ESPÈCIE	PRESENCIA PER MES	RECOMPTE				
			Transsecte				
			1	2	3	4	5
R	<i>Anthocharis cardamines</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Anthocharis euphenoides</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Argynnis paphia</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Aricia cramera</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Brintesia circe</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Cacyreus marshalli</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Callophrys avis</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Callophrys rubi</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Carcharodus alceae</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Celastrina argiolus</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Charaxes jasius</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Coenonympha dorus</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Coenonympha pamphilus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Colias crocea</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Danaus chrysippus</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Danaus plexippus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Euchloe crameri</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Euphydryas aurinia</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Favonius quercus</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Gegenes nostradamus</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Glaucopsyche melanops</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Gonepteryx rhamni</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Hipparchia fidia</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Hipparchia semele</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Hipparchia statilinus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Iphiclides feisthamelii</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Lampides boeticus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Lasiommata megera</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Leptidea sinapis</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Leptotes pirthous</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Libythea celtis</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Limenitis reducta</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Lycaena phlaeas</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Maniola jurtina</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Melanargia lachesis</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Melanargia occitanica</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Melitaea didyma</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Ochlodes sylvanus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Papilio machaon</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pararge aegeria</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pieris brassicae</i>	G F M A M J J A S O N D					
O	<i>Pieris napi</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pieris rapae</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Polyommatus icarus</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pontia daplidice</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Pyrgus armoricanus</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Pyrgus malvoides</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pyronia bathseba</i>	G F M A M J J A S O N D					
	<i>Pyronia cecilia</i>	G F M A M J J A S O N D					
R	<i>Pyronia tithonus</i>	G F M A M J J A S O N D					

O	<i>Satyrrium esculi</i>	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	<i>Thymelicus acteon</i>	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	<i>Vanessa atalanta</i>	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	<i>Vanessa cardui</i>	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
R	<i>Zerynthia rumina</i>	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Observacions:																		
R = rarament present a la ciutat, molt improbable d'aparèixer als censos; O = ocasionalment present a la ciutat, improbable d'aparèixer als censos																		

Recorda que per a censar és convenient que es donin les següents condicions meteorològiques:

- Temperatura de 13 a 35 °C.
- De 13 a 17 °C ha d'haver-hi un mínim de 50 % de sol.
- Amb més 18 °C es poden fer els censos amb menys de 50 % de sol.

Per a espècies en les quals sigui senzill reconèixer el sexe és convenient anotar-lo per als individus en què ho vegis clarament.

¹Velocitat del vent en funció de l'escala de Beaufort. Si hi ha ratxes de vent tria un valor mitjà:

Valor	Velocitat (km/h)	Efectes
0	0 - 1	El fum ascendeix verticalment.
1	2 - 5	El fum indica la direcció del vent.
2	6 - 11	Es mouen les fulles dels arbres. El vent es nota a la cara.
3	12 - 19	Es mouen les branques, onegen les banderes.
4	20 - 28	S'aixeca pols i papers. Es mouen les capçades dels arbres. És preferible censar amb menys vent.
5	> 29	Es mouen els arbres petits i les branques de mides considerables.

²Escala de categories del sol (versus nuvolositat):

Valor	Efectes
S	Completament assolellat.
SSN	Assolellat amb alguns núvols.
SN	Mig destapat, mig ennuolat. Censar si la temperatura > 18 °C.
SNN	Pràcticament tapat, es veu un poc el sol. Censar si la temperatura > 18 °C.
N	Completament tapat. No censar.